

## Répondeur pomme

Dimanche le 16 juin 2013 06h30

### TAVELURE

Infections passées et prévues selon CIPRA

#### *St-Antoine-de-Tilly*

Date et heure de début de la pluie	Nombre d'heures de mouillure	Température moyenne °C	Accumulation de pluie (mm)	Infection (selon CIPRA)
11 juin à 10h29	22,5	14,1	16	Élevée
16 juin à 12h30*	38,5*	14,2*	10*	Élevée*

#### *Ste-Famille*

Date et heure de début de la pluie	Nombre d'heures de mouillure	Température moyenne °C	Accumulation de pluie (mm)	Infection (selon CIPRA)
------------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

11 juin à 12h50	19,2	14,1	12	Moyenne
16 juin à 12h30*	38,5*	14,2*	10*	Élevée*

\* Préviation

**Note** : la pluie devrait débuter aujourd'hui tout juste après midi. On annonce 10 mm de pluie aujourd'hui et 10 mm supplémentaires lundi. Autant pour St-Antoine que Ste-Famille, et selon RIMpro, une nouvelle infection est prévue durant la pluie et cette infection devrait débuter lundi matin au levé du soleil.

Nombre moyen de feuilles par pousse

07-juin	08-juin	09-juin	10-juin	11-juin	12-juin	13-juin	14-juin	15-juin
9,35	9,80	9,90	10,30	11,05	11,40	11,65	12,05	12,45

Methodologie : sélection et évaluation du feuillage de 5 pousses au verger pilote de Ste-Famille (les feuilles entièrement déployées, les demi-feuilles et les quarts de feuilles sont pris en compte)

**Note** : Ce tableau vous permet d'estimer le nombre de nouvelles feuilles qui ont poussé depuis le moment de l'application de votre dernier fongicide.

**Captures d'ascospores sur les rotorods du verger pilote de Ste-Famille** : selon les derniers relevés, des ascospores sont encore capturées. Le risque d'infections primaires n'est pas terminé.

Si ce n'est déjà fait, il est recommandé de renouveler la protection de votre feuillage, avant le début de la pluie mais le plus près possible du début de la pluie. Protégez votre feuillage avec un fongicide de CONTACT (MAESTRO, CAPTAN, POLYRAM). Si les prévisions météo s'avèrent correctes, il tombera moins de 25 mm de pluie donc votre fongicide ne sera pas délavé. Je vous rappelle qu'il est important d'avoir un pluviomètre afin de mesurer la quantité réelle de pluie qui tombe chez-vous et vérifier le délavement des fongicides de CONTACT. Enfin, n'oubliez pas d'alterner les matières actives d'une intervention à l'autre.

À noter que si vous ne parvenez pas à renouveler votre protection à temps, attendez la fin de la pluie pour appliquer un fongicide systémique de post-infection sur feuillage sec (FLINT, SOVRAN)

Mais rappelez-vous qu'il est préférable (et moins dispendieux) de maintenir une couverture adéquate à l'aide de fongicides de CONTACT (protectant) plutôt que d'attendre la fin de la période de mouillure pour appliquer un fongicide systémique de post-infection. Enfin, sachez que plusieurs des produits recommandés en post-infection sont possiblement inefficaces ou partiellement efficaces en raison des nombreux cas de résistance rapportés pour ces produits.

Bonne journée !

Christian Lacroix, agronome

[christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca)

418-386-7461

Répondeur pomme : 418-643-0033 poste 4