

Forficula auricularia Dermaptera : Forficulidae

EUROPEAN EARWIG



Adulte

1-2 générations

Pré-bouton rose Bouton rose Floraison Calice Début été Mi-été Pré-récolte

Caractéristiques

Le forficule, ou perce-oreille, est brun foncé, de forme allongée et muni de pinces (**A**) à l'arrière de son corps. Ses élytres courts ne recouvrent pas entièrement son abdomen.

Répartition

Il existe de nombreuses espèces de forficules, répandues dans l'ensemble des États et provinces producteurs de fruits de l'est de l'Amérique du Nord.



(photo : Charles Vincent -
A Agriculture et
Agroalimentaire Canada)

Dégâts

Le forficule s'attaque au pommier, au poirier et, parfois, à d'autres arbres fruitiers. Il consomme parfois les feuilles ou les fruits endommagés, mais il est aussi un prédateur de pucerons et de chenilles.

Moyens de lutte

Le forficule cause peu de problèmes, et la tolérance est souvent plus économique et plus judicieuse que l'intervention.



Cette fiche fait partie du *Guide d'identification - Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques des arbres fruitiers*. Ce guide, comprenant l'ensemble des fiches, des clés diagnostiques, un index et un glossaire, a été entièrement réédité et il est disponible en formats papier et numérique sur le [catalogue du CRAAQ](#).