

Dernière mise à jour le **11 octobre 2018**

***Forficula auricularia*** Dermaptera : Forficulidae  
EUROPEAN EARWIG



Adulte

1-2 générations

Pré-bouton rose    Bouton rose    Floraison    Calice    Début été    Mi-été    Pré-récolte

**Caractéristiques**

Le forficule, ou perce-oreille, est brun foncé, de forme allongée et muni de pinces (**A**) à l'arrière de son corps. Ses élytres courts ne recouvrent pas entièrement son abdomen.

**Répartition**

Il existe de nombreuses espèces de forficules, répandues dans l'ensemble des États et provinces producteurs de fruits de l'est de l'Amérique du Nord.



(photo : Charles Vincent - Agriculture et Agroalimentaire Canada)

**Dégâts**

Le forficule s'attaque au pommier, au poirier et, parfois, à d'autres arbres fruitiers. Il consomme parfois les feuilles ou les fruits endommagés, mais il est aussi un prédateur de pucerons et de chenilles.

**Moyens de lutte**

Le forficule cause peu de problèmes, et la tolérance est souvent plus économique et plus judicieuse que l'intervention.



Cette fiche fait partie du *Guide d'identification - Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques des arbres fruitiers*. Ce guide, comprenant l'ensemble des fiches, des clés diagnostiques, un index et un glossaire, a été entièrement réédité et il est disponible en formats papier et numérique sur le [catalogue du CRAAQ](#).