

Dernière mise à jour le **15 juin 2018**

14e Message technique du Club Pro-pomme

15 juin 2018

Croissance

Diamètre moyen de 22 mm pour la McIntosh.

Tavelure

La quantité d'ascospores projetables diminue, mais il reste encore. Donc, on conserve la même dose de fongicide et on continue de renouveler la protection.

Précipitations

Dunham (33 mm), Saint-Hilaire (9 mm) Saint-Grégoire (19 mm), Rougemont (13 mm), Frelighsburg (27 mm) et Felighsburg Garagona (25 mm).

Carpocapse

Pour les producteurs qui ont une stratégie à deux traitements et qui vont utiliser le RIMON comme 1er traitement.

RIMON à 300 DJ

- Rougemont, Saint-Grégoire et Saint-Hilaire : Vous avez déjà atteint le 300 DJ
- Dunham et Frelighsburg : Aujourd'hui et en fin de semaine, vous allez atteindre le 300 DJ

Pour le synchronisme de l'application

Les conditions optimales pour la ponte sont lors de soirées chaudes (optimales à 25 degrés, minimum à 14) sans vent, donc pour un ovicide efficace en pré-ponte (RIMON), faire le traitement juste avant ces conditions météo.

Stéphanie Gervais, agronome et Mélanie Normandeau-Bonneau, Biologiste
Club Pro-pomme