

Dernière mise à jour le **29 août 2018**

Ce sommaire des observations et prévisions est compilé à partir des données prises dans les vergers pilotes et des rapports des observateurs du Réseau-pommier.

Cliquez sur le tableau pour l'agrandir.

Région pomicole	Québec	Estrie	Montérégie	Missisquoi	Sud-ouest	Laurentides	Verger du Réseau (Saint-Bruno)
	Prévisions ou observations						Captures
Carpocapse - fin captures (1 ^{re} gén.)	24 juillet	22 juillet	11 juillet	16 juillet	9 juillet	15 juillet	12 ↓
Carpocapse - pic captures (2 ^e gén.)	25 août	25 août	8 août	15 août	7 août	14 août	
T. bandes obliques - 1 ^{re} capture (2 ^e gén.)	13 août	11 août	31 juillet	5 août	31 juillet	5 août	96,5 ↓
T. bandes obliques - pic de capture (2 ^e gén.)	29 août	28 août	13 août	20 août	13 août	20 août	
Sésie du cornouiller - fin captures	9 août	8 août	29 juillet	3 août	29 juillet	3 août	9,5 ↓
Mineuse marbrée - pic captures (2 ^e gén.)	16 juillet	13 juillet	4 juillet	9 juillet	4 juillet	8 juillet	103 ↓
T. bandes rouges - fin captures (2 ^e gén.)	10 août	9 août	31 juillet	5 août	31 juillet	4 août	28,5 ↓
T. bandes rouges - 1 ^{re} capture (3 ^e gén.)	22 août	22 août	10 août	15 août	10 août	15 août	
Mouche de la pomme - pic captures	8 août	6 août	27 juillet	1 ^{er} août	26 juillet	1 ^{er} août	6,5 ↓
Mouche de la pomme - fin captures	31 août	29 août	16 août	21 août	15 août	22 août	
	<i>Météo</i>						
DJ5 standard cumulés	1603 ↑	1646 ↑	1858 ↑	1770 ↑	1851 ↑	1758 ↑	1888 ↑
DJ5 Baskerville cumulés	1623 ↑	1668 ↑	1873 ↑	1787 ↑	1869 ↑	1776 ↑	1905 ↑
Mm pluie des 7 derniers jours	19 ↑	12 ↔	21 ↑	17 ↑	3 ↓	21 ↑	19 ↔

Sites : Les vergers pilotes considérés sont : Québec (Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-Tilly), Estrie (Compton), Montérégie (Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Paul, Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Sainte-Cécile), Missisquoi (Dunham et Frelighsburg), Sud-ouest (Franklin et Hemmingford) et Laurentides (Oka et Saint-Joseph).

Prévisions : Les prévisions pour les ravageurs sont basées sur les modèles du Réseau, et les prévisions météo d'Environnement Canada des 5 à 7 prochains jours. Les normales sont utilisées pour compléter les prévisions. La date indiquée représente la plus hâtive des prévisions obtenues pour la région. Les prévisions ne doivent jamais remplacer l'observation et le dépistage de votre verger!

Observations : Informations rapportées par les observateurs du Réseau. La date indiquée représente la plus hâtive des observations rapportées pour la région.

Captures dans le verger du Réseau-pommier : captures cumulatives par piège dans le bloc de pommiers sous gestion PFI de Saint-Bruno.

Degrés-jours : Cumulés en base 5 °C depuis le 1er mars, selon la méthode Baskerville en raison de sa plus grande précision (ce qui nécessite l'emploi d'outils informatiques comme Cipra). La méthode standard (qui nécessite uniquement de connaître la température maximale et minimale de chaque jour) n'est pas interchangeable avec la méthode utilisée par Cipra! Le débourrement du pommier, par exemple, correspond à 65 DJ5 « standards », mais à 79 DJ5 « Baskerville ».

Météo : Les données météo sont validées par Solutions Mesonet. Les DJ et les précipitations rapportées représentent la moyenne des valeurs obtenues pour tous les sites d'une région. Les flèches représentent l'écart à la normale pour cette région : ↑ = au-dessus de la normale; ↓ = au-

dessous; \leftrightarrow = semblable.