

MESSAGE TECHNIQUE DU CLUB DE POMICULTURE MISSISQUOI AU 13 juillet 2020.

Municipalités : Dunham et Frelighsburg.

Sylvain Brousseau, agronome.

Observations générales : Une grande remontée de l'humidité ambiante. Canicule la semaine passée, retour à 20 degrés ensuite.

Grêle : Pas depuis 1 semaine.

Bénéfiques : Prédateurs généralistes : Pour l'ensemble : De peu à beaucoup de coccinelles asiatiques selon les vergers. Araignées nombreuses dans 2 vergers.

Punaise de la molène : Présence de quelques adultes et larves dans tous les vergers. Quelques larves de syrphide avec pucerons verts.

Prédateurs d'acariens : Allothrombiums dans 1 verger, encore montée de population des phytoséides et agistèmes un peu partout, sauf où eu du Nexter.

Oïdium : Peu de nouveau développement.

Feu bactérien : Vu des nouveaux symptômes sur McIntosh, Empire et quelques autres variétés. Évidemment, recommandé de couper les branches atteintes.

Tavelure : Pas vu de taches.

Punaises pentatomides : Oeufs et larves plutôt fréquents. (Il y a aussi eu du parasitisme par petites guêpes contre les oeufs).

Puceron rose du pommier : Pas de nouvelles branches atteintes. Le Calypso à 440 mL/ha avait été efficace.

Charançons : Pas de nouveaux dégâts.

Tétranyques rouges : Grande augmentation dans 2 vergers : Recommandé et traité : Un avec Nexter et l'autre avec Acramite*.

Tétranyque à deux points, tétranyque de McDaniel : Ils ont du être traités dans un verger avec *Acramite.

Carpocapse :

Quelques dégâts récents (vergers avec et sans confusion) mais c'est peu en général. Donc en général très beau dans l'ensemble du Club . Néanmoins recommandation de Calypso dans 5 vergers à cause des captures et antécédents.

Cicadelle de la pomme de terre : Encore une légère augmentation.

Cécidomyie du pommier : Stable mais nombreuses sont les pousses affectées (dans tous les vergers).

Tordeuse à bandes obliques : Jeunes larves de la première génération d'été : Maximum observé sur jeunes pousses en croissance : 4 %. (Entre 5 et 7 mm de long).

Mouche de la pomme : Quelques captures (0 à 1 par piège).

Puceron lanigère : Quelques vergers avec plusieurs très petites colonies.

Traitements effectués :

Voir plus haut (1 verger avec acramite contre mite rouge, à deux points et de McDaniel ; 1 autre verger avec Nexter contre la mite rouge).

Sylvain Brousseau, agr.

