

	RAVAGEURS			
	CARPOCAPSE DE LA POMME	TORDEUSE À BANDES ROUGES	MINEUSE MARBRÉE	PETIT CARPOCAPSE
PIÈGE	Multi-Pher I	Multi-Pher II ou III	Multi-Pher II ou III	Multi-pher II ou III
PHÉROMONE	Trécé	Trécé	Trécé	Scentry
NOMBRE DE PIÈGES	Vergers avec antécédents de dégâts : 1 à 3 pièges (ou paires de pièges) par section de 12 ha de verger. Si des paires sont utilisées, considérer uniquement les captures des 3 pièges les plus efficaces	Vergers avec antécédents de dégâts : 1 par section de 12 ha de verger	Vergers avec antécédents de dégâts : 1 par section de 12 ha de verger	Vergers avec antécédents de dégâts : 1 par section de 12 ha de verger
	Autres vergers : 1 par verger		Autres vergers : 1 par verger	Autres vergers : 1 par verger
PÉRIODE DE POSE	Floraison	Débourrement	Débourrement	Bouton rose
FRÉQUENCE DES RELEVÉS	Une à deux fois par semaine selon l'historique	Une fois par semaine	Une fois par semaine	Une fois par semaine
PÉRIODE DE RETRAIT	Septembre	Septembre	Septembre	Septembre
POSITION DANS LE VERGER	Au centre du verger ou de chaque secteur à risques	Au centre du verger ou de chaque section	Au centre du verger ou de chaque section	Au centre du verger ou de chaque secteur à risques
POSITION DANS L'ARBRE	À la hauteur des yeux (1,5 m), à l'intérieur des arbres	À la hauteur des yeux (1,5 m), à l'intérieur des arbres	À la hauteur des yeux (1,5 m), à l'intérieur des arbres	À la hauteur des yeux (1,5 m), à l'intérieur des arbres
SEUIL D'INTERVENTION (comptage cumulatif des captures sauf si autrement spécifié)	Première génération : (mi-mai à mi-juillet) : 10 captures par piège par semaine pour 2 semaines consécutives Deuxième génération : dans les vergers avec historique de dégâts, 15 à 20 captures par piège par semaine pour 2 semaines consécutives; dans les vergers sans historique de dégâts, 25 à 30 captures par piège par semaine pour 2 semaines consécutives	500 captures par piège	3000 à 5000 captures par piège (15 à 25 ml dans un cylindre gradué de 10 ml)	300 à 500 (seuil approximatif). Les captures peuvent être importantes sans que des dégâts soient produits
REMARQUES	Le dépistage du carpocapse doit être basé sur l'observation des dégâts et l'historique des dommages est essentiel pour déterminer les besoins de traitements. Les méthodes et les seuils diffèrent si votre verger utilise un programme de lutte par confusion sexuelle: consultez la fiche sur le carpocapse de la pomme pour les détails.		Le seuil d'intervention peut être rehaussé en présence de parasites : consultez la fiche sur la description et efficacité des parasitoïdes	Le dépistage du petit carpocapse se complète par l'observation des dégâts et l'historique des dommages est essentiel pour déterminer les besoins de traitements. Voir les fiches sur le carpocapse de la pomme et la fiche sur les vers occasionnels du fruit pour les détails