

	RAVAGEURS		
	HOPLOCAMPE DES POMMES	PUNAISE TERNE	MOUCHE DE LA POMME
PIÈGES	Carton blanc englué	Carton blanc englué	Sphère rouge engluée
NOMBRE DE PIÈGES	1 par section de 2 ha (minimum de 4 par verger)	1 par section de 2 ha (minimum de 4 par verger)	1 par section de 2 ha (minimum de 4 par verger)
PÉRIODE DE POSE	Bouton rose	Mi-avril, avant le débourrement	Fin juin
FRÉQUENCE DES RELEVÉS	Une à deux fois par semaine selon l'historique	Une à deux fois par semaine selon l'historique	Une fois par semaine
PÉRIODE DE RETRAIT	Mi-juin ou dès la nouaison	À la nouaison	Septembre
POSITION DANS LE VERGER	Entre les 1er et 4e rangs au pourtour du verger; de préférence dans les variétés hâtives	2e rangée au pourtour du verger	Entre les 1er et 4e rangs au pourtour du verger; de préférence près des boisés et dans les variétés hâtives
POSITION DANS L'ARBRE	À la hauteur des yeux (1,5 m) sur une branche fructifère, de préférence face au sud et à environ 1 mètre du tronc	À la hauteur des genoux (75 cm), à l'extérieur des arbres, sur une branche fructifère, au-dessus d'un espace engazonné	À la hauteur des yeux (1,5 m) sur une branche fructifère, de façon à ce qu'il soit bien visible et à l'abri du vent
SEUIL D'INTERVENTION (comptage cumulatif des captures)	5 captures par piège	2,5 à 4 captures par piège. Compléter par le dépistage de l'activité sur bourgeons (seuil jusqu'au débourrement avancé : 10 à 15 % des bourgeons occupés par une punaise ou présentant de l'exsudat; au pré-bouton rose: 3 à 5%; au bouton rose: 1 à 2%)	Pommes d'exportation : 1 mouche par piège. Autres marchés : 2 mouches par piège. Après la fin juillet : 5 mouches par piège
REMARQUES	De nombreux bouquets à fruits doivent être présents dans le voisinage du piège, mais enlever ceux à moins de 10 cm du piège. Pour éviter les réinfestations répétées, couper tous les pommiers abandonnés de même que les arbres de la famille des Rosacées (ex. : pommiers et cerisiers sauvages) autour du verger	De nombreux bouquets à fruits doivent être présents dans le voisinage du piège, mais enlever ceux à moins de 10 cm du piège. L'exsudat est une goutte de sève qui apparaît à la suite d'une piqûre de nutrition par la punaise terne. Ne pas installer les pièges sur les mêmes arbres que ceux de l'hoplocampe	Des fruits doivent être présents dans le voisinage du piège, mais enlever ceux à moins de 10 cm du piège. Pour éviter les réinfestations répétées, couper tous les pommiers abandonnés de même que les arbres de la famille des Rosacées (ex. : pommiers et cerisiers sauvages) autour du verger. Consultez la fiche sur la mouche de la pomme pour d'autres détails