












Guide du dépistage

Voir la fiche Grilles de dépistage pour les vergers du Guide de PFI pour plus d'informations
<https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-65>



RAVAGEUR	CARPOCAPSE DE LA POMME	CHARANÇON DE LA PRUNE	CICADELLE BLANCHE (IMMATURE)	COCHENILLES	HOPLOCAMPE DES POMMES	MINEUSE MARBRÉE	MOUCHE DE LA POMME	PETIT CARPOCAPSE	PUCERON LANIGÈRE	PUCERON ROSE	PUNAISE DE LA MOLÈNE	PUNAISE TERNE	TORDEUSE À BANDES OBLIQUES
	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-76	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-72	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-75	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-80	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-71	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-73	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-77	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-85	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-78	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-78	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-83	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-70	 https://reseau-pommier.irda.qc.ca/fiche-pfi/fiche-74
ADULTE													
DÉGÂTS													
MÉTHODE	1 à 3 pièges par section de 12 ha (minimum de 1 piège par verger)	Observer les dégâts sur fruits en périphérie du verger et sur cultivars hâtifs	Observer 100 feuilles par bloc (10 par arbre standard ou 5 par arbre nain ou semi-nain)	Observer 100 fruits par section de 12 ha (10 par arbre standard ou 5 par arbre nain ou semi-nain)	1 piège par section de 2 ha (minimum de 4 par verger)	Vergers avec historique de dégâts : 1 piège par section de 12 ha (minimum de 1 piège par verger)	1 piège par section de 2 ha (minimum de 4 par verger)	Vergers avec historique de dégâts : 1 piège par section de 12 ha (minimum de 1 piège par verger)	Observer 100 cicatrices de taille et gourmands par bloc (5 par arbre)	Observer 100 bouquets floraux par bloc (10 / arbre standard ou 5 / arbre nain ou semi-nain)	Observer les fruits de 100 bouquets par bloc (10 par arbre). Principalement les variétés Délicieuse, Spartan et Gala	1 piège par section de 2 ha (minimum de 4 par verger)	Observer 100 bouquets par bloc (10 par arbre)
POSE DES PIÈGES / DÉBUT DES OBSERVATIONS	Floraison	Entre le stade calice et la nouaison	Gén. 1 : Floraison Gén. 2 : Début août	Une fois, à la récolte	Bouton rose	Débourrement	Fin juin	Bouton rose	Juin	Débourrement avancé	Début de la floraison	Avant le débourrement	Bouton rose
RETRAIT DES PIÈGES / FIN DES OBSERVATIONS	Septembre	Début à mi-juillet	Gén. 1 : Nouaison Gén. 2 : Fin août	Une fois, à la récolte	Entre le stade calice et la nouaison	Septembre	Septembre	Septembre	Mi-août	Fin juin	2 à 3 semaines après le stade calice	Entre le stade calice et la nouaison	Nouaison
SEUIL D'INTERVENTION	Gén. 1 sans confusion sexuelle: 10 captures/piège, deux relevés successifs. Seuil d'intervention différent sous confusion sexuelle. Voir fiche carpocapse de la pomme	Premier traitement : au stade calice ou dès les premiers dégâts	Gén. 1 : 0,5 larve / feuille Gén. 2 : 1 larve / feuille	De 3 à 5 % des fruits infestés	5 captures / piège	3 000 à 5 000 captures / piège	2 captures / piège et 4-5 captures / piège au mois d'août. Seuil d'intervention différent avec le GF-120. Voir fiche mouche de la pomme	300 à 500 captures / piège	Présence de colonies sur 50 % des cicatrices ou gourmands	Plus de 10 % des bouquets contenant plus de 20 pucerons	Entre 1 et 5 % des fruits affectés	2,5 à 4 captures par piège	Chenilles dans 0,5 à 3 % des bouquets
REMARQUES	L'historique des dommages est le meilleur indicatif pour déterminer les besoins de traitements	Traitement additionnel localisé/en bordure : dès que 1 % des fruits d'un secteur sont affectés (2 % à partir de la fin juin)	Ne pas inclure les gourmands pour le dépistage de la cicadelle blanche	Traitement recommandé : huile supérieure au stade de débourrement la saison suivante	De nombreux bouquets à fruits doivent être présents dans le voisinage du piège. Enlever ceux qui sont à moins de 10 cm du piège	1 ml d'un cylindre gradué de 10 ml = 200 captures	Les pièges peuvent être déplacés sur les cultivars hâtifs. Seuil abaissé de 1 capture / piège pour les pommes destinées à l'exportation	Le dépistage se complète par l'observation des dégâts et par la prise en compte de l'historique des dommages pour déterminer les besoins de traitement	Le seuil doit être augmenté en présence de prédateurs et de parasitoïdes dans les colonies de pucerons	Les variétés Cortland et Gala (et leurs différentes lignées) sont particulièrement susceptibles à l'attaque du puceron rose	Cet insecte est aussi un important prédateur de pucerons et d'acariens. Peu de dommage après 10 mm	Le dépistage se complète par l'observation de l'activité de la punaise sur bourgeons	On recommande rarement des traitements contre la génération estivale (seconde génération)